



CRECEMAX 8-24

PRESENTACIÓN: 1L-5L-10L-20L-200L

Fecha de revisión:
17/07/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Fertilizante en solución para aplicación en suelo y foliar, recomendado para etapas de alto requerimiento de energía. Puede aplicarse al suelo como acondicionador, activador de los nutrientes o bien para favorecer el desarrollo del sistema radicular. El fósforo es esencial para el transporte de energía en la planta, estimula la floración, el cuajado y la formación de frutos, y las hace más resistentes a las enfermedades. El nitrógeno es contribuyente de la clorofila, proteínas y aminoácidos que participan en la estructura y funciones vitales de la planta. La materia orgánica en conjunto con los ácidos húmicos actúan como acarreadores de micronutrientes y potencializadores de procesos enzimáticos dando a la planta fortaleza en los momentos de estrés.

RECOMENDACIONES:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% P/v
Nitrógeno (N)	8%
Fósforo (P2O5)	24,0%
Potasio (K2O)	4%
Fierro (Fe EDDHA)	3000ppm
Zinc (EDTA)	1000ppm
Fúlvicos	2000ppm
Silicio	10000ppm
Materia Orgánica	0.5%
Diluyentes y Acondicionadores	61.9%
Total:	100%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
Aspecto	Líquido
Color	Café Oscuro
Olor	Característico
pH	5,7-6,5 A 20° C
Densidad	1,13-1,20 g/cc (20° C)
Formulación	Concentrado soluble-SL

CULTIVO	DOSIS L/Ha	ETAPA DE APLICACIÓN
Frutales: Aguacate, arándano, café, vid, cítricos, durazno, fresa, manzana, frambuesa, mango, nogal, papaya, piña, zarzamora, plátano.	10-20 L	Aplicar dirigida al suelo desde el inicio del cultivo y durante todo el desarrollo del cultivo.
Hortalizas: Brócoli, chile, melón, calabaza, tomate, papa, sandía.	10-20 L	Aplicar cada semana 5L en etapa temprana y 10L para dar más vigor a la planta a partir de floración y hasta el término de la cosecha.
Arroz, cereales, garbanzo, frijol, maíz, sorgo, trigo.	5-10 L	Aplicar de 5 a 10 días después de la siembra o en el amacollamiento y momento de embuche e inicio de llenado.
Caña de azúcar.	20 L	Aplicar después del corte en el primer riego y repetir al inicio de temporada de lluvias.
Cultivos en general.	3-10 L	Aplicar de manera foliar desde los 5 días después del trasplante hasta la salida del cultivo

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Se deben observar las precauciones generales del buen uso y manejo. Manéjelo con equipo de protección completo: mascarilla, guantes impermeables, lentes de seguridad con protección lateral y ropa protectora (overol). Nocivo si se ingiere, provoca moderada irritación ocular. Después de la aplicación lávese con agua y jabón, y cámbiese de ropa.

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No se ingiera y evite el contacto del producto con los ojos y la piel.

En caso de presentar molestias por el contacto con el producto lleve a la persona con un médico.

PRIMEROS AUXILIOS

Si la intoxicación fue por ingestión y el paciente está consciente, induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta. Si fue por contacto, quite la ropa impregnada y dúchelos, abríguelos y recuéstelos en un lugar ventilado. En caso de contacto en los ojos, lave con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si está consciente no administre nada por la boca y vigile que respire sin dificultad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Respete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en los suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o agua del lavado de equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.

GARANTÍA

La empresa garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de uso.

CONTRAINDICACIONES

No mezclar con fertilizantes que contengan calcio, no aplicar con vientos fuertes.

Aplicar antes de las 12:00 pm o después de las 6:00 pm, no aplicar en horas de mucho calor ni próximas a una lluvia.

