



HUMICAL BZN

PRESENTACIÓN: 1L-5L-10L-20L-100L-200L

Fecha de revisión:
17/07/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Nutriente foliar a base de CALCIO-BORO-ZINC, diseñado para corregir deficiencias y prevenir desequilibrios en floraciones, cuajados y llenado de frutos. Contiene agentes quelatadores que favorecen la rápida absorción de estos elementos en zonas donde más lo requieren. Aporta los nutrientes necesarios para realizar la síntesis de los diversos constituyentes a nivel celular, engrosa las paredes celulares, mejora la polinización, incrementa la floración, amarre de frutos y la vida en anaquel, activando y promoviendo ciertos procesos enzimáticos.

RECOMENDACIONES:

CULTIVO	DOSIS L/Ha	ETAPA DE APLICACIÓN
Tomate y chile	0.75 1.25L	Apartir de la primera floración repetir cada 8 días.
Papa	1-2L	Apartir de la primera tuberculación repetir cada 8 días.
Maíz	1-2L	Apartir de la hoja bandera repetir cada 8 días durante 3 aplicaciones.
Brócoli, coliflor, repollo y col de brucelas	1-2L	Aplicar al inicio del meristemo y repetir cada 8 días.
Sandía, melón y pepino	1-2L	Aplicar al inicio del primer set de floración.
Frutales en general	2-4L	Aplicar a partir del inicio de los primeros botones frutales y durante el llenado del fruto. Repetir cada 15 días.
Papaya	2-3L	Aplicar en antesis y al inicio del llenado del fruto y repetir de 12-15 días.
Café	1-2L	Aplicar al inicio de floración y repetir de 12 a 15 días.
Acelga y espinaca	1-2L	Aplicar a los 30 días después de la siembra y repetir cada 8 días.
Vid	2-4L	Aplicar al inicio de floración y repetir cada 20 días.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Marrón oscuro
Olor	Característico
pH	6,5±1
Densidad	1,17-1,23 g/cc
Formulación	Concentrado soluble-SL

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Se deben observar las precauciones generales del buen uso y manejo. Manéjelo con equipo de protección completo: mascarilla, guantes impermeables, lentes de seguridad con protección lateral y ropa protectora (overol). Nocivo si se ingiere, provoca moderada irritación ocular. Después de la aplicación lávese con agua y jabón, y cámbiese de ropa.

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No se ingiera y evite el contacto del producto con los ojos y la piel.

En caso de presentar molestias por el contacto con el producto lleve a la persona con un médico.

PRIMEROS AUXILIOS

Si la intoxicación fue por ingestión y el paciente está consciente, induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta. Si fue por contacto, quite la ropa impregnada y dúchelos, abríguelos y recuéstelos en un lugar ventilado. En caso de contacto en los ojos, lave con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si está consciente no administre nada por la boca y vigile que respire sin dificultad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Respete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en los suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o agua del lavado de equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.

GARANTÍA

La empresa garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de uso.

CONTRAINDICACIONES

No mezclar con fertilizantes que contengan fósforo, en caso de aplicación foliar no aplicar con vientos fuertes.
Aplicar antes de las 12:00 pm o después de las 6:00 pm, no aplicar en horas de mucho calor ni próximas a una lluvia.



GRUPO RIBEMA



gruporibema@gmail.com



562-640-54-84